PROCEDURA OPERATIVA

AD ESCLUSIVO USO INTERNO DEL

3 **S.S.U.Em. 118 - BRIANZA**

PROCEDURA DP EQUIPAGGIO MSB_ AED SENZA INVIO DI MSA

ESECUTORE: EQUIPAGGIO DI SOCCORSO

SCOPO: garantire una corretta gestione del pz. in ACC durante l'applicazione del protocollo DP

RISORSE: a) sistema radio b) sistema telefonico
c) DPR 27/03/92 – Legge n°120 del 03/04/2001- D.R. n° 7/10306 del 16/09/2002

COSA FARE/DIRE:	COME FARE/DIRE:
1 All'arrivo in posto	**1 A** Valutare ABC **1 B** Premere il tasto "6" della radio portatile per confermare ACC alla COEU **1 C** Attuare Protocollo DP: 1. accendere il DAE 2. se necessario preparare il torace 3. applicare gli elettrodi 4. consentire l'analisi del DAE 5. comunicare esito analisi in COEU
A) Se l'analisi del ritmo da parte del DAE segnala "Shock indicato"	**A 1** 6. erogare fino a tre scariche (se richieste) 7. ricerca polso e segni MO.TO.RE. 8. RCP per un minuto (se indicato) 9. consentire l'analisi del DAE 10. erogare fino a tre scariche (se richieste) 11. ricerca polso e segni MO.TO.RE. 12. RCP per un minuto (se indicato) 13. comunicare alla COEU di aver terminato il secondo ciclo di scariche della procedura 14. trasportare il pz in H (come da disposizioni COEU) 15. continuare RCP durante il trasporto (se indicato)
B) Se l'analisi del ritmo da parte del DAE segnala "Shock NON indicato"	**B 1** 6. iniziare manovre di RCP 7. attendere indicazioni da parte della COEU
C) Se ricompare il polso centrale durante o dopo l'attuazione del protocollo DP	**C 1** Contattare immediatamente la COEU e attendere indicazioni dalla COEU **C 2** Se scompare il polso centrale: 1. inviare stato "S6" dalla radio veicolare 2. far fermare il mezzo 3. consentire l'analisi del DAE 4. comunicare esito analisi in COEU 5. se richiesto, effettuare una nuova sequenza della DP (UNICA TRIPLETTA) 6. al termine della terza scarica, se polso assente iniziare RCP 7. contattare la COEU 8. riprendere il trasporto in H come da indicazioni della COEU

AVVERTENZE:

NB: Il protocollo DP viene attuato sul luogo dell'evento al massimo fino alla seconda tripletta di defibrillazioni prima di iniziare il trasporto in H.

Durante il trasporto il DAE *chiuso nella custodia* rimane sempre acceso fino alla consegna del pz. al personale di PS per garantire la raccolta dei dati del soccorso.

Durante il trasporto in H, l'equipaggio deve continuare l'RCP senza seguire le indicazioni fornite dal DAE (salvo diversa indicazione della COEU).

DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE Dr.ssa Gian Piera ROSSI

VERSIONE DEFINITIVA DEL: 23 gen. 03 | AGGIORNAMENTI: 02/03 – 03/05

PROCEDURA OPERATIVA

AD ESCLUSIVO USO INTERNO DEL

S.S.U.Em. 118 - BRIANZA

PROCEDURA DP EQUIPAGGIO BLS_ AED SENZA INVIO DI MSA

ESECUTORE: *Equipaggio di Soccorso*

SCOPO: garantire una corretta gestione del pz. in ACC durante l'applicazione del protocollo DP

RISORSE: a) sistema radio b) sistema telefonico
c) DPR 27/03/92 –Legge n°120 del 03/04/2001- D.R. n° 7/10306 del 16/09/2002

COSA FARE/DIRE:		COME FARE/DIRE:	
1	**All'arrivo in posto**	**1a** **1b** **1c**	**Valutare ABC** **Confermare ACC alla CO** **Attuare Protocollo DP:** **1. accendere il DAE** **2. se necessario preparare il torace** **3. applicare gli elettrodi** **4. consentire l'analisi del DAE**
	A) <u>Se</u> l'analisi del ritmo da parte del DAE segnala "<u>Shock indicato</u>"	**A1**	**5. erogare fino a tre scariche (se richieste)** **6. RCP per un minuto** **7. consentire l'analisi del DAE** **8. erogare fino a tre scariche (se richieste)** **9. RCP per un minuto** **10. Comunicare alla CO di aver terminato il secondo ciclo di scariche della procedura** **11. trasportare il pz in H (come da disposizioni CO)** **12. continuare RCP durante il trasporto**
	B) <u>Se</u> l'analisi del ritmo da parte del DAE segnala "<u>Shock NON indicato</u>"	**B1**	**6. iniziare manovre di RCP** **6. attendere indicazioni da parte della CO**
	C) Se ricompare il polso centrale durante o dopo l'attuazione del protocollo DP	**C1** **C2** **C3**	**Contattare immediatamente la CO** **Attendere indicazioni della CO** **Se scompare il polso centrale:** **1. contattare immediatamente CO** **2. far fermare il mezzo** **3. effettuare una nuova sequenza della DP (UNICA TRIPLETTA)** **4. al termine della terza scarica, se polso assente iniziare RCP** **5. contattare la CO** **6. riprendere il trasporto in H come da indicazioni della CO**

AVVERTENZE:

NB: Il protocollo DP viene attuato sul luogo dell'evento al massimo fino alla seconda tripletta di defibrillazioni prima di iniziare il trasporto in H.

Durante il trasporto il DAE *<u>chiuso nella custodia</u>* rimane sempre acceso fino alla consegna del pz. al personale di PS per garantire la raccolta dei dati del soccorso.

Durante il trasporto in H, l'equipaggio deve continuare l'RCP senza seguire le indicazioni fornite dal DAE (salvo diversa indicazione della CO).

DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE Dr.ssa Gian Piera ROSSI

VERSIONE DEFINITIVA DEL: 23 gen. 03 | AGGIORNAMENTI: 10 feb. 03 – 14 feb. 03